



İNCİR MUCİZESİ

İNCİR AĞACI

İNCİR ÇEŞİTLERİ

SAĞLIĞIMIZA
YARARLARI

İLGİNÇ BİLGİLER

KURAN'DA DIKKAT
ÇEKİLEN MEYVE:
İNCİR

ALLAH'IN
SONSUZ RAHMETİ

[ana sayfa](#)

[Kuran meali](#)

İNCİR AĞACI FIG TREE

Dutgillerden olan incir ağacının anayurdu ÖNASYA ve Akdeniz havzasıdır. The fig tree from Dutgiller and the Mediterranean basin ÖNASYA is anayurdu. Ülkemizde en çok İZMİR ve AYDIN yöresinde yetiştirilir. In our country, most are grown in Izmir and AYDIN region.



İklim isteği: incir ağacı ılık bölgelerin bitkisidir.
Climate request: fig tree is a plant of warm regions.
Yıllık ortalama sıcaklığın 18-20 derece olduğu

yerlerde iyi yetişir. Annual average temperature is 18-20 degrees grows well in places. Ekim-kasım aylarında -3 derece; kışın ağacın dinlenme döneminde -7 ile -9 dereceler ve ilkbaharda -1 derece sıcaklıklar ağaca zarar verir. -3 Degrees in the months October-November, winter tree in the period of rest and -7 to -9 degrees in spring-1 degree temperatures will damage the tree.

Toprak isteği: incir ağacı, toprak yönünden fazla seçici değildir. Soil request: fig tree, from the direction of soil is not too selective. Ama derin, kumlu -killi, organik madde yönünden zengin, yüksek oranda kirece sahip ve su tutma kapasitesi iyi olan topraklarda ürün verimi ile niteliği artar. But the deep, sandy-clay, organic matter-rich, high rates of lime and water holding capacity with good yield and quality of products in the soil increases. İncir ağacı çok nemli topraklar ile yüksek taban suyundan zarar görür. Fig tree with a very high base water from moist soil will be damaged.

Sulama: incir ağacının yıllık yağış isteği 550-600 mm'dir. Irrigation: fig tree to annual rainfall is 550-600 mm. Yağışlar bu miktarın altına düşerse, özellikle ağacın sürgün dönemi olan nisan-mayıs aylarında yağış yetersizse sulama gerekir. Rain falls below this amount, especially with tree exile period is inadequate rainfall in April-May months irrigation is needed. Ama, meyvenin olgunlaşma döneminde ağaçlara su verilmez. But, in the period of maturity of the fruit trees are not water. Aksi takdirde meyveler çatlar ve zarar görür. Otherwise, the fruit

will be damaged and the roof.

Gübreleme: incir ağacının toprağına, yanmış çiftlik gübresi ile noksanlığı varsa tarım kireci verilmesi yararlı olur. **Fertilizing:** fig tree in the soil, farm fertilizer, with the burnt lime to give flaw if there is useful for agriculture. **Gübreleme için toprak ve yaprak analizi yaptırılmalıdır.** Soil and leaf analysis should be made for farming.

Toprağın işlenmesi: İncir ağaçlarının toprağı, havalandırma, yağışlardan iyi yararlanma ve yabancı otların kontrolü ile ürüne hazırlanması amacıyla yılda üç kez (ilkbahar, haziran ayı ve sonbaharda) işlenir. **Soil treatment:** soil of the fig tree, ventilation, better utilization of rainfall and with weed control products for the preparation three times a year (spring, and autumn in the month of June) is processed. Çok eğimli alanlarda erozyona neden olacağı için sonbahar işleme yapılmaz. Will cause erosion in areas of very inclined to work is not done in autumn.

Budama: İncir ağaçları önce şekil, sonra ürün budaması ve ağaç yaşlanınca gençleştirme budaması ister. **Pruning:** first as the fig tree, then prune the product and want to prune trees rejuvenescence the aging. Bu işleri, ağacı tanıyan kişiler yapmalıdır. This work, the person who made the tree should be recognized.

Hasat (Derim): Taze olarak yenilecek incirler, tadı ve görünüşü çeşide uygun tam kıvama eriştiğinde

elle toplanır. Harvest (My Skin): to be eaten as fresh figs and varieties available to taste and imagination reaches full consistency is collected manually. Taze olarak hasat edilmeyen incirler, ağaç üzerinde su yitirip buruşur ve kendiliğinden yere dökülür. Fresh figs are harvested as, trees lose water and shrivel up and over will be poured on the ground itself. İşte bunlar kurutulacaksa, toprak üzerinde uzun süre kalmaması için her gün, günde iki kez olmak üzere toplanır ve ayrıca bunlara kurutma işlemi uygulanır. Ancak kurutma işleminden önce sağlam ve bozulmuş incirler seçilerek ayıklanmalıdır. These dry soil does not stay on for long periods each day, which is collected twice a day and also provide them before the drying process and drying process has been corrupted uygulanır. Ancak figs are selected to be extracted.

AĞACININ ÜRETİLMESİ Tree production



İncir ağacı, gövde çelikleriyle ya da baladız adı verilen dip sürgünleriyle çoğaltılabilir. Fig tree, trunk, or the steel we are called balada dip may be reproduced in exile. Ancak bu şekillerde üretilen

ağaçlar meyveye geç yattığından ve bol bol dip sürgünü verdiği için yeşilmez. Produced in this way to fruit trees and that the yacht you prefer superfluously will dip to exile. Bunların yerine profesyonellerin ürettiği, türü bilinen fidanlar alınarak sonbaharda yaprak dökümünden sonra bahçelerde derin kazılan toprağa, düz yerlerde 7-8 m. Instead they produced professionals, type of plant known to be in the garden after the fall of the leaves in autumn, deep excavation in the earth, straight out of 7-8 m. ve yamaçlarda 6-7 m. and the slope of 6-7 m. aralık verilerek dikilmelidir. the vertical range should be given.

MEYVESİNİN TOPLANMASI : Taze olarak yenilecek incirler, tadı ve görünüşü çeşide uygun tam kıvama eriştiğinde elle toplanır. **FRUIT COLLECTION of:** Fresh figs are eaten by the taste and appearance, the types of access available to full consistency is collected manually. Taze olarak hasat edilmeyen incirler, ağaç üzerinde su yitirip buruşur ve kendiliğinden yere dökülür. Fresh figs are harvested as, trees lose water and shrivel up and over will be poured on the ground itself. İşte bunlar kurutulacaksa, toprak üzerinde uzun süre kalmaması için her gün, günde iki kez olmak üzere toplanır ve ayrıca bunlara kurutma işlemi uygulanır. These dry soil does not stay on for long periods each day, which is collected twice a day and also the drying process is applied to them. Ancak, kurutma işleminden önce sağlam ve bozulmuş incirler seçilerek ayıklanmalıdır. However, the drying process before the solid and must be

extracted by choosing the corrupt fig.

